

Ganglion van Gasseri blokkade

Sweet-procedure

www.nwz.nl

Inhoud


Wat is het ganglion van Gasseri?	3
Wat is trigeminus neuralgie?	4
Blokkade van het ganglion Gasseri	4
Uw voorbereiding	4
De behandeling	6
Na de behandeling	7
Complicaties (risico's)	7
Uw vragen	8

In overleg met uw behandelaar krijgt u vanwege aangezichtspijn een zogenoemde ‘ganglion van Gasseri blokkade’, ook wel ‘Sweet-procedure’ genoemd. In deze folder vindt u uitleg over de behandeling.

■ Wat is het ganglion van Gasseri?

Het ganglion Gasseri is een zenuwknoop die in de schedel naast de hersenstam ligt. Het ganglion vertakt zich in de drielingzenuw, nervus trigeminus genoemd. De nervus trigeminus is een zenuw die uit 3 afzonderlijke takken bestaat. Elke tak verzorgt het gevoel van een deel van het aangezicht:

1. de bovenste tak, de nervus ophthalmicus, verzorgt het gevoel van het voorhoofd en het oog
2. de middelste tak, de nervus maxillaris, verzorgt het gevoel van de bovenkaak en neus
3. de onderste tak, de nervus mandibularis, verzorgt het gevoel van de onderkaak



Ganglion Gasseri

■ Wat is trigeminus neuralgie?

Aangezichtspijn veroorzaakt door irritatie/overprikkeling van de nervus trigeminus noemen we trigeminus neuralgie. De meest voorkomende oorzaak van trigeminus neuralgie is een bloedvat dat tegen de zenuw aandrukt. Maar vaak is er voor de overprikkeling geen oorzaak te vinden.

■ Blokkade van het ganglion Gasseri

Door blokkade van het ganglion Gasseri kan de pijn bij trigeminus neuralgie meestal verminderen of verdwijnen. Blokkade gebeurt door verhitting op de plaats van de zenuwknop. We noemen deze behandeling ook wel 'Sweet-procedure', naar de ontdekker dr. Sweet.

■ Uw voorbereiding

Belangrijk om door te geven

Geef tijdens uw afspraak aan uw behandelaar door:

- welke bloedverdunnende en/of andere medicijnen u eventueel gebruikt: geef een overzicht van alle medicijnen. Een compleet overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek
- als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters
- als u (mogelijk) zwanger bent
- als u een pacemaker of ICD draagt: in dit geval betrekken wij een pacemaker- of ICD-deskundige bij de behandeling

Zijn deze gegevens al bekend bij het Pijncentrum? Dan hoeft u geen contact op te nemen.

Heeft u koorts, antibiotica of geen pijn?

Heeft u koorts of gebruikt u antibiotica? Of heeft u al enkele dagen tot weken heel weinig of geen pijn? Neem dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Meestal kan de behandeling niet doorgaan en moet de afspraak verzet worden. U vindt het telefoonnummer en e-mailadres van het Pijncentrum achter in deze folder.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen. De behandelaar vertelt u als u moet stoppen met uw bloedverdunders. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Gebruikt u bloedverdunders maar heeft u geen instructieschema ontvangen bij deze folder? Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per e-mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de behandelaar andere afspraken met u heeft gemaakt.

Eten en drinken

U krijgt sedatie en moet voor de behandeling nuchter zijn. Dat betekent dat u:

- tot 6 uur voor de behandeling nog mag ontbijten: alleen toegestaan is brood, ontbijtkoek, beschuit, boter, kaas, vleeswaren, zoet beleg, melkproducten, thee en koffie met melk (eventueel met suiker). Daarna mag u niets meer eten
- tot 2 uur voor de behandeling alleen nog helder vloeibaar mag drinken: alleen toegestaan is water, limonade zonder prik, thee en koffie zonder

melk (eventueel met suiker) en heldere appelsap. Daarna mag u niets meer drinken

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

- een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. Als u toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners, dan hoeft u geen overzicht mee te nemen. Meer informatie over toestemming geven vindt u op www.nwz.nl/toestemming
- uw identiteitsbewijs
- iets voor de ontspanning, bijvoorbeeld: muziek met koptelefoon, boek, tijdschrift of tablet (er is WiFi aanwezig)

Kleding en sieraden

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Onder begeleiding naar huis

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Als u dat wel doet, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw verzekeringsdekking. Vraag iemand om u naar huis te brengen.

■ De behandeling

Sedatie (roesje)

Voor de behandeling is sedatie noodzakelijk.

Meer informatie over sedatie vindt u in de folder 'Procedurele sedatie en/of analgesie', afdeling anesthesiologie. U vindt deze folder ook op onze website www.nwz.nl/patientenfolders

De ingreep

Een anesthesioloog-pijnspecialist voert de behandeling uit. Voor het plaatsen van de naald in uw wang in de buurt van het ganglion Gasser, maakt de

behandelaar gebruik van röntgenstralen. Vervolgens wordt u iets wakkerder gemaakt. De specialist controleert met een klein elektrisch stroompje de positie van de naaldpunt. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt u weer in slaap gebracht en verwarmt de specialist de naaldpunt. Zo nodig herhaalt de specialist dit.

■ Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog geruime tijd. Als u zich goed voelt, mag u daarna onder begeleiding naar huis. De rest van de dag mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

Resultaat van de ganglion van Gasseri blokkade

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken goed te beoordelen. Maar het is ook goed mogelijk dat u al eerder merkt dat uw pijnklachten minder zijn. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Controle

Wij bellen u 1 dag na de behandeling en 4 weken na de behandeling voor controle. U mag ook altijd vragen om een poliklinische controle afspraak bij uw behandelaar.

U bouwt de pijnmedicatie die u vóór de behandeling gebruikte, pas enige tijd ná deze behandeling af. U doet dit altijd onder begeleiding van uw anesthesioloog-pijnspecialist. Stop dus nooit zonder overleg zelf met uw medicijnen.

Napijn

Het kan zijn dat u napijn krijgt. Dit gaat na een paar dagen tot weken vanzelf over. U kunt zo nodig volgens voorschrift paracetamol gebruiken.

■ **Complicaties (risico's)**

Zoals bij iedere behandeling bestaat er een kleine kans op complicaties:

- een bloeditstorting in de wang
- een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts
- in zeer zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslimvlies in het hersenvocht terecht komen. Hierdoor kan een hersenvliesontsteking ontstaan. Krijgt u **binnen 6 uur** na de behandeling hoge koorts boven de 38,5 graden Celsius met hoofdpijn en nekstijfheid? Neem dan tijdens kantooruren onmiddellijk contact op met het Pijncentrum. Neem buiten kantooruren onmiddellijk contact op met de spoedeisende hulp van Noordwest Ziekenhuisgroep
- een zeer zeldzame complicatie bij deze ingreep is ‘anesthesia dolorosa’. In het gezicht ontstaat dan een plek die zo ‘ongevoelig’ wordt dat het pijn doet. Deze pijn is vaak even erg of erger dan de oorspronkelijke pijn. Deze complicatie is moeilijk te behandelen

■ Uw vragen

U kunt voor medisch inhoudelijke vragen tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de verpleegkundig pijnconsulent. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met Noordwest Pijncentrum op werkdagen van 09:00-13:00 en 14:00-16:30 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Meer informatie

Meer informatie over Noordwest Pijncentrum, bereikbaarheid en parkeren vindt u op www.nwz.nl/pijnbestrijding

■ Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie pijncentrum
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 184849

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl