

Klier lokalisatie/TAD procedure

U heeft van de arts gehoord dat de gemarkeerde lymfeklier uit uw oksel verwijderd moet worden, ook wel TAD-procedure genoemd (Targeted Axillary Dissection).

■ Wanneer een TAD procedure?

Een TAD procedure wordt gedaan bij patiënten die eerst chemo- of hormoontherapie hebben gekregen, waarbij voor de start van de behandeling kwaadaardige cellen zijn aangetoond in een lymfeklier in de oksel. Om de operatie goed te laten verlopen moet de chirurg eerst deze gemarkeerde lymfeklier vinden. Hiervoor krijgt u een lokalisatie van de desbetreffend klier (klier lokalisatie).

■ Waarom een klier lokalisatie?

De chirurg kan de lymfeklier in de oksel niet zien of voelen. Daarom krijgt u de dag voor de operatie een ijzerdraadje in de lymfeklier ingebracht. Voordat u met chemo- of hormoontherapie bent begonnen, is er een marker geplaatst in de aangedane lymfeklier in uw oksel. Het uiteinde van het ijzerdraadje komt bij de marker in deze lymfeklier te liggen. Hierdoor weet de chirurg precies welke lymfeklier er bij u moet worden verwijderd.

■ Hoe verloopt de klier lokalisatie?

De radioloog zoekt de gemarkeerde klier op met behulp van echografie of een CT-scan. Daarna verdooft deze zo nodig uw huid. Vervolgens brengt de radioloog een naald in op de plaats waar de lymfeklier met marker ligt. In deze naald zit het ijzerdraadje (= lokalisatiedraadje). Vervolgens trekt de radioloog de naald terug zodat het ijzerdraadje op deze plek blijft liggen. Het ijzerdraadje blijft in de oksel, met het uiteinde in de gelokaliseerde klier. Deze blijft vastzitten dankzij een soort ankertje aan het einde van het draadje. Het ijzerdraadje blijft voor een deel buiten de oksel. Daarom dekken we het stevig af met een gaasje en een pleister. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Wij raden u aan om gemakkelijke kleding te dragen.

■ Na de klier lokalisatie

Vaak zijn er naast de klier lokalisatie ook nog andere afspraken gepland voor de voorbereiding van uw operatie zoals de lokalisatie van de schildwachtklier. Na alle afspraken mag u weer naar huis.

■ Belangrijk om te weten

- na de klier lokalisatie kan uw oksel wat gevoelig zijn en kan een bloeding optreden op de plaats waar u bent geprikt
- bij pijn mag u 2 tabletten paracetamol van 500 mg gebruiken per keer. U mag deze maximaal 4 keer verdeeld over de dag innemen
- u mag niet douchen nadat het draadje is geplaatst
- de dag na de lokalisatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip in het ziekenhuis voor de operatie
- 7-10 werkdagen na de operatie is het weefselonderzoek bekend. U krijgt daarvoor een afspraak bij de chirurg. Deze bespreekt dan ook met u of een aanvullende behandeling nodig is