

# Instructieschema bloedverdunners

## Pijncentrum

In onderstaand schema kunt u aflezen welke bloedverdunnende medicijnen u moet staken. Ook leest u wanneer u moet stoppen en wanneer u weer kunt starten met het innemen van het medicijn. Weet u niet zeker welk medicijn u gebruikt? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum.

[Ruimte voor patiëntenetiket]

Uw behandeling vindt plaats op .....

<input type="checkbox"/> <b>Acenocoumarol</b> - wanneer stoppen?  - wanneer weer starten?	3 dagen voor de behandeling of volgens afspraak van de trombosedienst  na behandeling op reguliere tijd
<input type="checkbox"/> <b>Fenprocoumon (Marcoumar)</b> - wanneer stoppen?  - wanneer weer starten?	5 dagen voor de behandeling of volgens afspraak van de trombosedienst na behandeling op reguliere tijd
<input type="checkbox"/> <b>Nadroparine (Fraxiparine)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	24 uur voor behandeling 24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> <b>Dabigatran (Pradaxa)</b> - wanneer stoppen? U krijgt te horen hoe lang u van te voren met dit middel moet stoppen. Is dat niet aan u doorgegeven? Belt u ons dan alstublieft op.  - wanneer weer starten?	<input type="checkbox"/> 24 uur voor de behandeling <input type="checkbox"/> 36 uur voor de behandeling <input type="checkbox"/> 48 uur voor de behandeling  24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> <b>Apixaban (Eliquis)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> <b>Rivaroxaban (Xarelto)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling

<input type="checkbox"/> <b>Edoxaban (Lixiana)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> <b>ASA (Ascal, Ascal Cardio, Carbasalaatcalcium (Cardio))</b>	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
<input type="checkbox"/> <b>Acetylsalicylzuur (Asprine, Aspégic, Alka-Seltzer, Aspro)</b>	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
<input type="checkbox"/> <b>Dipyridamol (Persantin, Asasantin)</b>	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
<input type="checkbox"/> <b>Clopidogrel (Grepid, Plavix)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	7 dagen voor de behandeling 7 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> <b>Prasugrel (Efient)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	7 dagen voor de behandeling 7 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> <b>Ticagrelor (Brilique)</b> - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	5 dagen voor de behandeling 7 uur na behandeling

### Uw vragen

Heeft u vragen over dit schema? Of weet u niet zeker welk medicijn u gebruikt? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar [pijnbestrijding@nwz.nl](mailto:pijnbestrijding@nwz.nl). Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.