

Blokkade van het ganglion pterygopalatinum

www.nwz.nl

Inhoud

Wat is het ganglion pterygopalatinum?	3
Uw voorbereiding	4
De behandeling	6
Na de behandeling	7
Bijwerkingen en complicaties	8
Uw vragen	9

In overleg met uw behandelaar krijgt u voor uw aangezichtspijn of hoofdpijn een zogenoemde ‘blokkade van het ganglion pterygopalatinum’. In deze folder vindt u uitleg over de behandeling.

■ Wat is het ganglion pterygopalatinum?

Het ganglion pterygopalatinum is een zenuwknoop die achter de neus ligt. De zenuwknoop zorgt voor het gevoel in bepaalde delen van het gezicht. Als u lijdt aan bepaalde vormen van hoofd- en aangezichtspijn, kunt u in aanmerking komen voor een behandeling van het ganglion pterygopalatinum. De behandeling kan op 3 manieren plaatsvinden:

- met medicatie
- met Pulsed Radio Frequente stroom (PRF), soms in combinatie met medicatie
- met Radio Frequente stroom (RF), soms in combinatie met medicatie

Wat is een behandeling van het ganglion pterygopalatinum met medicatie?

Bij deze behandeling krijgt u een verdovingsvloeistof, een pijnstillertje en een ontstekingsremmer met langdurige werking toegediend in de buurt van de zenuwknoop.

Wat is een PRF-behandeling van het ganglion pterygopalatinum?

PRF staat voor Pulsed Radio Frequente stroom. Met korte stroomstootjes legt de behandelaar bij de zenuwknoop een elektromagnetisch veld aan. Hierdoor wordt de zenuwknoop beïnvloed en neemt de pijn af.

Wat is een RF-behandeling van het ganglion pterygopalatinum?

RF staat voor Radio Frequente stroom. Bij een RF-behandeling verhit de behandelaar het ganglion pterygopalatinum met radiofrequente (RF) stroom, waarbij het ganglion wordt beschadigd. De zenuwknoop kan herstellen. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden.

■ Uw voorbereiding

Belangrijk om door te geven

Geef tijdens uw afspraak aan uw behandelaar door:

- welke bloedverdunnende en/of andere medicijnen u eventueel gebruikt: geef een overzicht van alle medicijnen. Een compleet overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek
- als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters
- als u (mogelijk) zwanger bent
- als u een pacemaker of ICD draagt: in dit geval betrekken wij een pacemaker- of ICD-deskundige bij de behandeling

Zijn deze gegevens al bekend bij het Pijncentrum? Dan hoeft u geen contact op te nemen.

Heeft u koorts, antibiotica of geen pijn?

Heeft u koorts of gebruikt u antibiotica? Of heeft u al enkele dagen tot weken heel weinig of geen pijn? Neem dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Meestal kan de behandeling niet doorgaan en moet de afspraak verzet worden. U vindt het telefoonnummer en e-mailadres van het Pijncentrum achter in deze folder.

Tijdelijk stoppen met bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen. De behandelaar vertelt u als u moet stoppen met uw bloedverdunders. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdunnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdunnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van 13:00-14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Gebruikt u bloedverdunders maar heeft u geen instructieschema ontvangen bij deze folder? Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per e-mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdunnende medicijnen kunt doorgaan.

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de behandelaar andere afspraken met u heeft gemaakt.

Eten en drinken

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken tenzij de behandelaar andere afspraken met u heeft gemaakt.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

- een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. Als u toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners, dan hoeft u geen overzicht mee te nemen. Meer informatie over toestemming geven vindt u op www.nwz.nl/toestemming
- uw identiteitsbewijs

Kleding en sieraden

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

De verblijfsruimte

Uw naaste of begeleider neemt tijdens de behandeling plaats in de wachtkamer tot u naar huis mag. Wij verzoeken u om kinderen niet mee te nemen naar uw behandeling.

Onder begeleiding naar huis

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Als u dat wel doet, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw verzekeringsdekking. Vraag iemand om u naar huis te brengen.

■ De behandeling

Een anesthesioloog-pijnspecialist en een assistente voeren de behandeling uit. Voor het plaatsen van de naald in de wang, in de buurt van het ganglion pterygopalatinum, maakt de behandelaar gebruik van röntgenstralen.

Behandeling met medicatie

Bij behandeling met medicatie controleert de behandelaar met contrastvloeistof of de naald op de juiste plaats staat. Vervolgens krijgt u verdovingsvloeistof, een pijnstillertje (clonidine) en een ontstekingsremmer met langdurig effect (corticosteroïd) toegediend via de naald.

PRF-behandeling

Bij een PRF-behandeling controleert de behandelaar met een kleine elektrische stroom de positie van de naaldpunt. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt er behandeld met PRF stroom. Soms wordt een PRF-behandeling gecombineerd met een behandeling met medicatie.

RF-behandeling

Bij een RF-behandeling controleert de behandelaar met een kleine elektrische stroom de positie van de naaldpunt. Als de naald op de juiste plaats staat,

wordt er behandeld met RF stroom. Soms wordt een RF- behandeling gecombineerd met een behandeling met medicatie.

■ Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog geruime tijd. Als u zich goed voelt, mag u daarna onder begeleiding naar huis. De rest van de dag mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

Resultaat van de behandeling

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken goed te beoordelen. Maar het is ook goed mogelijk dat u al eerder merkt dat uw pijnklachten minder zijn. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Controle

Wij bellen u 1 dag na de behandeling en 4 weken na de behandeling voor controle. U mag ook altijd vragen om een poliklinische controle afspraak bij uw handelaar. Het kan ook zijn dat u afsprekt dat u zelf zo nodig contact opneemt.

Afbouwen pijnmedicatie

U bouwt de pijnmedicatie die u vóór de behandeling gebruikte, pas enige tijd ná deze behandeling af. U doet dit altijd onder begeleiding van uw anesthesioloog-pijnspecialist. Stop dus nooit zonder overleg zelf met uw medicijnen.

■ Bijwerkingen en complicaties

Napijn

Het kan zijn dat u napijn krijgt. Dit gaat na een paar dagen tot weken vanzelf over. U kunt zo nodig volgens voorschrift paracetamol gebruiken.

Bijwerkingen corticosteroïden

Corticosteroïden (methylprednisolon of dexamethason) kunnen na de behandeling bijwerkingen geven. Deze gaan vanzelf weer over.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- een rood of warm gezicht/opvliegers tot ongeveer 3 dagen
- onregelde menstruatie. Ook vrouwen na de overgang kunnen vaginaal bloedverlies hebben. Dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is
- patiënten met diabetes kunnen een verhoogde bloedsuiker hebben. Controleer de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel als u insuline gebruikt
- stemmingswisselingen
- de anticonceptiepil en hormoon houdend spiraaltje kunnen 1 periode minder betrouwbaar zijn

Complicaties (risico's)

Zoals bij iedere behandeling bestaat er een kleine kans op complicaties:

- een bloedneus
- een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts
- een bloeditstorting in de wang
- er is een kleine kans dat een deel van het gehemelte doof aanvoelt. In zeldzame gevallen is er een doof gevoel in de bovenkaak en/of tandenrij
- allergische reactie

■ Uw vragen

U kunt voor medisch inhoudelijke vragen tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de verpleegkundig pijnconsulent. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met Noordwest Pijncentrum op werkdagen van 08:30 - 13:00 en 14:00 - 16:30 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Meer informatie

Meer informatie over Noordwest Pijncentrum, bereikbaarheid en parkeren vindt u op www.nwz.nl/pijnbestrijding

■ Notices

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie pijncentrum
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 186965

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl