

Minimaal knikje in de pols

Torus fractuur bij uw kind

www.nwz.nl



Noordwest
Ziekenhuisgroep

Inhoud

De behandeling	4
Instructies	4
Herstel	5
Opnieuw aandoen van de brace	5
Oefeningen	5
Uw vragen	5

Uw kind heeft een kleine breuk in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols (torus fractuur). Het is een knikje in het bot. We behandelen het met een brace en een sling. Dit is een soort mitella.

Samenvatting

- uw kind heeft een kleine breuk (knikje) in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols
- deze breuk herstelt doorgaans zonder restklachten
- we maken geen standaard poliklinische controle afspraak, dit is over het algemeen niet nodig
- de sling kunt u verwijderen zodra de pijn dit toelaat. De brace mag u na 1 week verwijderen. Als uw kind dan nog teveel pijn heeft, dan mag uw kind het gebruik van de brace in de tweede week afbouwen
- om stijfheid van de pols te voorkomen is het belangrijk dat uw kind na 1-2 weken begint met bewegen
- een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van de brace kunt u vinden in de Virtual Fracture Care App
- als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u op maandag t/m vrijdag van 8.30-10.00 uur en 13.30-15.00 uur contact opnemen via de 'breuklijn': 072 - 548 2465

■ De behandeling

Deze torus fractuur van de pols of onderarm komt vaak voor bij kinderen. We behandelen deze breuk met een afneembare brace en een sling. Dit is een soort mitella. De behandeling ziet er als volgt uit.

week 0 - 1	<ul style="list-style-type: none">• sling verwijderen zodra de pijn het toelaat• brace nog blijven dragen
week 1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• brace verwijderen zodra de pijn het toelaat
week 3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• vrij bewegen van de pols
na 4 weken	<ul style="list-style-type: none">• uw kind kan weer sporten en gymmen

■ Instructies

Volg de volgende instructies voor een goede genezing:

- de brace en sling houden de arm in een prettige positie
- uw kind mag de sling afdoen zodra de pijn dat toelaat. De brace mag u na 1 week verwijderen. Heeft uw kind na 1 week nog te veel pijn? Dan mag uw kind het gebruik van de brace in de tweede week langzaam afbouwen. Daarna moet de brace afblijven
- de breuk zit dicht bij de pols. Daarom is het belangrijk dat uw kind na 1 tot 2 weken begint met bewegen. Dat voorkomt stijfheid van de pols en het bevordert de genezing en het herstel
- na 3 weken mag uw kind voorzichtig weer activiteiten uitvoeren. Dit is op geleide van pijnklachten, dus alleen als hij de pijn kan verdragen. Als het niet lukt, kan uw kind beter nog even wachten
- tijdens het douchen mag de brace even af. Let er op dat de arm helemaal droog is voor u de brace weer omdoet. Instructies over het opnieuw aanbrengen van de brace kunt u vinden in de app
- heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in

■ Herstel

Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. Meestal geneest de breuk binnen enkele weken volledig.

Blijft uw kind pijn houden of blijft de pols minder goed functioneren? Neem dan contact op met de 'breuklijn': 072 - 548 2465. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.

■ Opnieuw aandoen van de brace

Als u de brace heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen, ziet u in het filmpje in de Virtual Fracture Care App hoe u de brace weer op de juiste manier aan kunt doen.

■ Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de pols beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de pols, oefent uw kind de pols ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

■ Uw vragen

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.nwz.nl

Contact maandag t/m vrijdag tussen 8.30-10.00 uur en 13.30-15.00 uur

- breuklijn: 072 - 548 2465

De Virtual Fracture Care app

Open de camera op uw telefoon en richt hem op de QR-code. U wordt automatisch naar de app verwezen.



Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie chirurgie
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 313049

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl