


Ethyleenglycol in serum

Synoniemen	Antivries, koelvloeistof, remvloeistof	
Analysemethode	GC-FID (methode is gevalideerd)	
	In huis ontwikkelde diagnostiek	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TOX.01	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 1 dag	
Referentiewaarden	Dal:	<50 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	200 mg/L
Bepalingsgrens	50 mg/L	
	5100 mg/L	
CTG code	072820	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelingsinformatie NVZA: Ethyleenglycol	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker pcd.bank@nwz.nl tel: 7376	
	Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar Apotheek-laboratorium@nwz.nl tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

17-05-2024 PB:
Bepalingsgrens aangepast
Hyperlinks hersteld
Link naar "Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek" toegevoegd
Kwaliteitssysteem toegevoegd

