


Flunitrazepam in plasma

Synoniemen	Rohypnol	
Analysemethode	LC-MS/MS	
Uitgevoerd door	Extern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	valt buiten de ISO 15189 scope van het externe laboratorium	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop) opsturen: plasma	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	10 – 15 mcg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	50 mcg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	072805	
Achtergrondinformatie	Zie Toxicologie behandelinformatie NVZA: Benzodiazepinen	
Contactpersoon	dhr. dr. P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker pcd.bank@nwz.nl tel: 7376	
	Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar. apothek-laboratorium@nwz.nl tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

05-08-2024:
extern laboratorium gewijzigd en daardoor het afname materiaal gewijzigd
hyperlinks hersteld
contactpersonen geactualiseerd