


Lamotrigine in serum

Synoniemen	Lamictal	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	In huis ontwikkelde diagnostiek	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TDM.02	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week op dinsdag, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. Materiaal dient op de bepalingsdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapothek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	2,5 – 15,0 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	20,0 mg/L
Bepalingsgrens	0,5 mg/L	
	25,0 mg/L	
CTG code	072841	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Lamotrigine	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker pcd.bank@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar	
	Apotheek-laboratorium@nwz.nl tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

28-03-2024 NP:

IVD uitleg toegevoegd

Contactpersoon gegevens aangepast

17-05-2024 PB:

Link naar 'Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek' toegevoegd

Kwaliteitssysteem toegevoegd

