


Sirolimus in bloed

Synoniemen	Rapamune	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml EDTA bloed afgenomen in een buis zonder gel (paarse dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 7 dagen Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	4 - 12
	Top:	-
	Toxisch vanaf	-
Bepalingsgrens	2,5 mcg/L	
	50 mcg/L	
CTG code	072866	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: Sirolimus	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker pcd.bank@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Laboratorium: apotheek-laboratorium@nwz.nl - tel:3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

26-03-2024 NP:

Bepaling wordt extern uitgevoerd. Bepalingsfrequentie en contact gegevens zijn aangepast