

Antibioticadrank

bij de pasgeboren baby

Uw baby heeft na de geboorte in het ziekenhuis antibiotica gekregen via het infuus, omdat er een vermoeden was op infectie. Pasgeboren baby's zijn gevoeliger voor infecties door een nog lage weerstand. Om zeker te weten dat de infectie goed wordt behandeld, moet uw baby in totaal 7 dagen antibiotica krijgen. De artsen hebben uw baby een paar dagen in de gaten gehouden en zien dat het goed genoeg gaat om naar huis te gaan. Daarom mag uw baby naar huis met antibioticadrank. Antibiotica via het infuus is niet meer nodig.

Antibiotica toedienen

Geef de antibioticadrank 2 x per dag (in de ochtend en de avond) aan uw baby. Doe dit vóór de voeding. Kies een vast tijdstip, bijvoorbeeld elke dag om 09:00 uur en 21:00 uur. Houdt hieronder bij wanneer u de antibiotica heeft gegeven.

Stappen (scan QR-code voor filmpje)

Stap 1

Trek de juiste hoeveelheid medicijn met een spuitje op uit het flesje met antibiotica. Hoeveel medicijn u moet geven kunt u terugvinden op het etiket van het flesje.

Stap 2

U kunt de antibiotica nu op twee verschillende manieren aan uw baby geven:

1. u spuit de antibiotica beetje bij beetje achterin in de wangzak van uw baby. Tussendoor laat u uw baby steeds even op een speen of uw vinger zuigen, of
2. u geeft uw baby de speen van een flesdop om op te zuigen en spuit hier de antibiotica in, terwijl uw baby aan de speen zuigt. Wanneer de speen volledig leeg is gezogen, kan de dop op de fles worden gedraaid en kan uw baby voeding krijgen

tijd ↓	datum →	.. : : : : : : ..
ochtend: .. : ..							
avond: .. : ..							



Voorzorgsmaatregelen

- let goed op dat uw baby alle antibiotica uit het spuitje binnenkrijgt
- vermeng de antibiotica nooit met de voeding. Zo weet u namelijk niet hoeveel antibiotica uw baby binnen heeft gekregen als de voeding niet opgaat
- als uw baby veel spuugt binnen 30 minuten na het geven van de antibiotica, moet u de antibioticadrink opnieuw geven. Een keer of enkele keren een klein mondje spugen is niet erg

Wanneer neemt u contact op?

Bij twijfels of vragen mag u altijd direct bellen naar het ziekenhuis. Het nummer van de kinderafdeling staat onderaan deze folder. Het is niet nodig eerst de verloskundige of huisarts te bellen. Het is belangrijk om uw kindje goed in de gaten te houden.

Neem in ieder geval direct contact op met de kinderarts bij 1 of meer van de volgende klachten:

- bij een temperatuur boven de 38 graden, of bij een temperatuur onder de 36 graden
- als uw baby niet wil drinken of de antibioticadrink niet wil innemen
- bij toenemend spugen
- als uw baby suf is. Een baby slaapt meestal veel, maar moet rondom de voedingsmomenten wel goed wakker worden om te drinken
- als u denkt dat uw kind ernstige bijwerkingen heeft van de antibiotica

Uw baby kan milde bijwerkingen hebben van de antibioticadrink zoals diarree en darmkrampen. De ontlasting van een jonge baby is over het algemeen nog wisselend. Het is niet altijd duidelijk of diarree en darmkrampen het gevolg zijn van de antibiotica. Deze klachten hebben geen langetermijngevolgen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met

- locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 - 548 2970
- locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 - 69 6360